

Fonctions de forme et points d'intégration des éléments finis

Résumé :

On décrit la géométrie et la topologie des éléments finis implantés dans *Code_Aster* ; pour chaque élément de référence, l'expression des fonctions de forme et les différentes familles de points d'intégration ainsi que les poids associés sont détaillés.

Table des Matières

1 Introduction.....	3
2 Les éléments linéiques : SE2, SE3 et SE4.....	4
3 Les éléments surfaciques.....	6
3.1 Triangles : ELREFE TR3, TR6, TR7.....	6
3.2 Quadrangles : ELREFE QU4, QU8, QU9.....	10
4 Les éléments volumiques.....	13
4.1 Tétraèdres : ELREFE TE4, T10.....	13
4.2 Pentaèdres : ELREFE PE6, P15, P18.....	15
4.3 Hexaèdres : ELREFE HE8 , H20 , H27.....	19
4.4 Pyramides : ELREFE PY5, P13.....	24
5 Bibliographie.....	28
6 Historique des versions du document.....	28

1 Introduction

Dans *Code_Aster*, on appelle "élément fini", un triplet (phénomène, modélisation, type de maille). Il y a trois phénomènes principaux : MECANIQUE, THERMIQUE et ACOUSTIQUE.

Il existe de nombreuses modélisations ; par exemple, pour le phénomène MECANIQUE : 3D, C_PLAN, D_PLAN, AXIS, DKT, POU_D_E, ...

Pour une modélisation donnée (par exemple 3D) d'un phénomène (par exemple MECANIQUE), il existe en général plusieurs éléments finis : un élément par type de maille supporté : HEXA8, HEXA20, PENTA6, ...

Au final, il existe donc de très nombreux éléments finis (plus de 500 en juillet 2004).

En revanche, les types de maille sont eux en nombre réduit : POI1, SEG2, SEG3, SEG4, TRIA3, TRIA6, TRIA7, QUAD4, QUAD8, HEXA8, HEXA20, ..., TETRA4, TETRA10.

En général, chaque élément fini, pour réaliser ses calculs élémentaires, utilise les notions de fonction d'interpolation (ou fonction de forme) et de schéma d'intégration. En général aussi, ces fonctions de forme et ces schémas d'intégration sont définis sur un élément dit "de référence" dont la géométrie est définie dans un système de coordonnées souvent appelé : (ξ, η, ζ) . Le passage de l'élément de référence à l'élément réel se fait grâce à une transformation géométrique qui utilise les mêmes fonctions d'interpolation. L'élément est alors dit "iso-paramétrique". Ces notions sont très bien expliquées dans [bib1].

Le nombre élevé d'éléments finis du code conjugué au nombre restreint des types de maille, conduit au fait qu'il existe plusieurs éléments finis s'appuyant sur un même type de maille ; par exemple le quadrilatère à 8 nœuds appelé QUAD8 supporte plus de 60 éléments finis différents.

En théorie, chaque élément fini peut choisir ses fonctions d'interpolation et ses schémas d'intégration comme il l'entend. Mais dans la pratique, presque tous les éléments finis s'appuyant sur le même type de maille, utilisent le même élément de référence, les mêmes fonctions de forme et les mêmes schémas d'intégration. Le but de ce document est de décrire ces différents éléments de référence.

Pour chaque élément de référence (appelé dans la suite du document ELREFE), on indiquera :

- la maille support, le nombre des nœuds, leur numérotation locale et leurs coordonnées,
- les expressions algébriques des fonctions de forme et de leurs dérivées premières (et parfois secondes)
- les familles de points d'intégration que l'on nommera. Pour chaque famille, on donnera le nombre de points, leurs coordonnées et leurs "poids" d'intégration. La somme de ces poids, doit donner le "volume" de l'élément de référence. Par exemple, le "volume" du quadrangle de référence ($-1 \leq \xi \leq +1$, $1 < \eta < +1$) vaut 4.

2 Les éléments linéiques : SE2, SE3 et SE4


SE2 : segment à 2 nœuds

nombre de nœuds : 2
nombre de nœuds sommets : 2

SE3 : segment à 3 nœuds

nombre de nœuds : 3
nombre de nœuds sommets : 2


	x
$N1$	-1.0
$N2$	1.0
$N3$	0.0



SE4 : segment à 4 nœuds

nombre de nœuds : 4
nombre de nœuds sommets : 2

	x
$N1$	-1.0
$N2$	1.0
$N3$	-1/3
$N4$	+1/3



fonctions de forme du segment à 2 nœuds :

$$w_1(x) = 0.5(1-x) \quad w_2(x) = 0.5(1+x)$$

fonctions de forme du segment à 3 nœuds :

$$w_1(x) = -0.5(1-x)x \quad w_2(x) = 0.5(1+x)x \quad w_3(x) = (1+x)(1-x)$$

fonctions de forme du segment à 4 nœuds :

$$w_1(x) = \frac{9}{16}(1-x)\left(x + \frac{1}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3}\right)$$

$$w_2(x) = -\frac{9}{16}(1+x)\left(\frac{1}{3} - x\right)\left(x + \frac{1}{3}\right)$$


$$w_3(x) = \frac{27}{16}(x-1)(x+1)\left(x - \frac{1}{3}\right)$$

$$w_4(x) = -\frac{27}{16}(x-1)(x+1)\left(x + \frac{1}{3}\right)$$

Nombre de points d'intégration	Point	x	Poids
1	1	0.0	2.0
2	1	0.577350269189626	1.0
	2	-0.577350269189626	1.0
3	1	-0.774596669241	0.55555...
	2	0.0	0.88888...
	3	0.774596669241	0.55555...
4	1	0.339981043584856	0.652145154862546
	2	-0.339981043584856	0.652145154862546
	3	0.861136311594053	0.347854845137454
	4	-0.861136311594053	0.347854845137454

3 Les éléments surfaciques

3.1 Triangles : ELREFE TR3, TR6, TR7



Coordonnées des nœuds :

	ξ	η
N1	0.0	0.0
N2	1.0	0.0
N3	0.0	1.0
N4	0.5	0.0
N5	0.5	0.5
N6	0.0	0.5
N7	1/3	1/3

Famille	Point	ξ	η	Poids
FPG1	1	1/3	1/3	1/2
FPG3	1	1/6	1/6	1/6
	2	2/3	1/6	1/6
	3	1/6	2/3	1/6
FPG4	1	1/5	1/5	25/(24*4)
	2	3/5	1/5	25/(24*4)
	3	1/5	3/5	25/(24*4)
	4	1/3	1/3	-27/(24*4)
FPG6	1	b	b	P2
	2	1 - 2b	b	P2
	3	b	1 - 2b	P2
	4	a	1 - 2a	P1
	5	a	a	P1
	6	1 - 2a	a	P1
COT3	1	1/2	1/2	1/6
	2	0	1/2	1/6
	3	1/2	0	1/6

Avec $P1 = 0.11169079483905,$ $P2 = 0.0549758718227661,$
 $A = 0.445948490915965,$ $b = 0.091576213509771$

Famille	Point	ξ	η	Poids
FPG7	1	1/3	1/3	9/80
	2	A	A	P1
	3	1-2A	A	P1
	4	A	1-2A	P1
	5	B	B	P2
	6	1-2B	B	P2
	7	B	1-2B	P2

Avec $A = 0.470142064105115$
 $B = 0.101286507323456$
 $P1 = 0.066197076394253$
 $P2 = 0.062969590272413$

Famille	Point	ξ	η	Poids
FPG12	1	A	A	P1
	2	1-2A	A	P1
	3	A	1-2A	P1
	4	B	B	P2
	5	1-2B	B	P2
	6	B	1-2B	P2
	7	C	D	P3
	8	D	C	P3
	9	1-C-D	C	P3
	10	1-C-D	D	P3
	11	C	1-C-D	P3
	12	D	1-C-D	P3

Avec

A = 0.063089014491502
 B = 0.249286745170910
 C = 0.310352451033785
 D = 0.053145049844816
 P1 = 0.025422453185103
 P2 = 0.058393137863189
 P3 = 0.041425537809187

TR3 : triangle à 3 nœuds

nombre de nœuds : 3
 nombre de nœuds sommets : 3

fonctions de forme et dérivées premières du triangle à 3 nœuds :

N	$\partial N / \partial \xi$	$\partial N / \partial \eta$
$1 - \xi - \eta$	-1	-1
ξ	1	0
η	0	1

TR6 : triangle à 6 nœuds

nombre de nœuds : 6
 nombre de nœuds sommets : 3

fonctions de forme, dérivées premières du triangle à 6 nœuds :

N	$\partial N / \partial \xi$	$\partial N / \partial \eta$
$-(1 - \xi - \eta)(1 - 2(1 - \xi - \eta))$	$1 - 4(1 - \xi - \eta)$	$1 - 4(1 - \xi - \eta)$
$-\xi(1 - 2\xi)$	$-1 + 4\xi$	0
$-\eta(1 - 2\eta)$	0	$-1 + 4\eta$
$4\xi(1 - \xi - \eta)$	$4(1 - 2\xi - \eta)$	-4ξ
$4\xi\eta$	4η	4ξ
$4\eta(1 - \xi - \eta)$	-4η	$4(1 - \xi - 2\eta)$

dérivées secondes du triangle à 6 nœuds :

$\partial^2 N / \partial \xi^2$	$\partial^2 N / \partial \xi \partial \eta$	$\partial^2 N / \partial \eta^2$
4	4	4
4	0	0
0	0	4
-8	-4	0
0	4	0
0	-4	-8

TR7 : triangle à 7 nœuds

nombre de nœuds : 7
nombre de nœuds sommets : 3

fonctions de forme du triangle à 7 nœuds :

N
$1 - 3(\xi + \eta) + 2(\xi^2 + \eta^2) + 7\xi\eta - 3\xi\eta(\xi + \eta)$
$\xi(-1 + 2\xi + 3\eta - 3\eta(\xi + \eta))$
$\eta(-1 + 2\xi + 3\eta - 3\xi(\xi + \eta))$
$4\xi(1 - \xi - 4\eta + 3\eta(\xi + \eta))$
$4\xi\eta(-2 + 3(\xi + \eta))$
$4\eta(1 - 4\xi - \eta + 3\xi(\xi + \eta))$
$27\xi\eta(1 - \xi - \eta)$


dérivées premières du triangle à 7 nœuds :

$\partial N / \partial \xi$	$\partial N / \partial \eta$
$-3 + 4\xi + 7\eta - 6\xi\eta - 3\eta^2$	$-3 + 7\xi + 4\eta - 6\xi\eta - 3\xi^2$
$-1 + 4\xi + 3\eta - 6\xi\eta - 3\eta^2$	$3\xi(1 - \xi - 2\eta)$
$3\xi(1 - 2\eta - \xi)$	$-1 + 3\xi + 4\eta - 6\xi\eta - 3\xi^2$
$4(1 - 2\xi - 4\eta + 6\xi\eta + 3\eta^2)$	$4\xi(-4 + 3\xi + 6\eta)$
$4\eta(-2 + 6\xi + 3\eta)$	$4\xi(-2 + 3\xi + 6\eta)$
$4\eta(-4 + 6\xi + 3\eta)$	$4(-1 - 4\xi - 2\eta + 6\xi\eta + 3\xi^2)$
$27\eta(1 - 2\xi - \eta)$	$27\xi(1 - \xi - 2\eta)$

dérivées secondes du triangle à 7 nœuds :

$\partial^2 N / \partial \xi^2$	$\partial^2 N / \partial \xi \partial \eta$	$\partial^2 N / \partial \eta^2$
$4 - 6\eta$	$7 - 6\xi - 6\eta$	$4 - 6\xi$
$4 - 6\eta$	$3 - 6\xi - 6\eta$	-6ξ
-6η	$3 - 6\xi - 6\eta$	$4 - 6\xi$
$4(-2 + 6\eta)$	$4(-4 + 6\xi + 6\eta)$	24ξ
24η	$4(-2 + 6\xi + 6\eta)$	24ξ
24η	$4(-4 + 6\xi + 6\eta)$	$4(-2 + 6\xi)$
-54η	$27(1 - 2\xi - 2\eta)$	-54ξ

3.2 Quadrangles : ELREFE QU4, QU8, QU9



Coordonnées des nœuds :

	ξ	η
N1	-1.0	-1.0
N2	1.0	-1.0
N3	1.0	1.0
N4	-1.0	1.0
N5	0.0	-1.0
N6	1.0	0.0
N7	0.0	1.0
N8	-1.0	0.0
N9	0.0	0.0

Famille	Point	ξ	η	Poids
FPG1	1	0	0	4
FPG4	1	$-a$	$-a$	1.0
	2	a	$-a$	1.0
	3	a	a	1.0
	4	$-a$	a	1.0
		$a=1/\sqrt{3}$		
FPG9	1	$-a$	$-a$	25/81
	2	a	$-a$	25/81
	3	a	a	25/81
	4	$-a$	a	25/81
	5	0.0	$-a$	40/81
	6	a	0.0	40/81
	7	0.0	a	40/81
	8	$-a$	0.0	40/81
	9	0.0	0.0	64/81
		$a=0.774596669241483$		

QU4 : quadrangle à 4 nœuds
 nombre de nœuds : 4
 nombre de nœuds sommets : 4

fonctions de forme, dérivées premières et secondes du quadrangle à 4 nœuds :

N	$\partial N / \partial \xi$	$\partial N / \partial \eta$
$(1-\xi)(1-\eta)/4$	$-(1-\eta)/4$	$-(1-\xi)/4$
$(1+\xi)(1-\eta)/4$	$(1-\eta)/4$	$-(1+\xi)/4$
$(1+\xi)(1+\eta)/4$	$(1+\eta)/4$	$(1+\xi)/4$
$(1-\xi)(1+\eta)/4$	$-(1+\eta)/4$	$(1-\xi)/4$

$\partial^2 N / \partial \xi^2$	$\partial^2 N / \partial \xi \partial \eta$	$\partial^2 N / \partial \eta^2$
0	1/4	0
0	-1/4	0
0	1/4	0
0	-1/4	0

QU8 : quadrangle à 8 nœuds

nombre de nœuds : 8
nombre de nœuds sommets : 4

fonctions de forme et dérivées premières du quadrangle à 8 nœuds :

N	$\partial N / \partial \xi$	$\partial N / \partial \eta$
$(1-\xi)(1-\eta)(-1-\xi-\eta)/4$	$(1-\eta)(2\xi+\eta)/4$	$(1-\xi)(\xi+2\eta)/4$
$(1+\xi)(1-\eta)(-1+\xi-\eta)/4$	$(1-\eta)(2\xi-\eta)/4$	$-(1+\xi)(\xi-2\eta)/4$
$(1+\xi)(1+\eta)(-1+\xi+\eta)/4$	$(1+\eta)(2\xi+\eta)/4$	$(1+\xi)(\xi+2\eta)/4$
$(1-\xi)(1+\eta)(-1-\xi+\eta)/4$	$-(1+\eta)(-2\xi+\eta)/4$	$(1-\xi)(-\xi+2\eta)/4$
$(1-\xi^2)(1-\eta)/2$	$-\xi(1-\eta)$	$-(1-\xi^2)/2$
$(1+\xi)(1-\eta^2)/2$	$(1-\eta^2)/2$	$-\eta(1+\xi)$
$(1-\xi^2)(1+\eta)/2$	$-\xi(1+\eta)$	$(1-\xi^2)/2$
$(1-\xi)(1-\eta^2)/2$	$-(1-\eta^2)/2$	$-\eta(1-\xi)$

dérivées secondes du quadrangle à 8 nœuds :

$\partial^2 N / \partial \xi^2$	$\partial^2 N / \partial \xi \partial \eta$	$\partial^2 N / \partial \eta^2$
$(1-\eta)/2$	$(1-2\xi-2\eta)/4$	$(1-\xi)/2$
$(1-\eta)/2$	$-(1+2\xi-2\eta)/4$	$(1+\xi)/2$
$(1+\eta)/2$	$(1+2\xi+2\eta)/4$	$(1+\xi)/2$
$(1+\eta)/2$	$-(1-2\xi+2\eta)/4$	$(1-\xi)/2$
$-1+\eta$	ξ	0
0	$-\eta$	$-1-\xi$
$-1-\eta$	$-\xi$	0
0	η	$-1+\xi$

QU9 : quadrangle à 9 nœuds

nombre de nœuds : 9
nombre de nœuds sommets : 4

fonctions de forme et dérivées premières du quadrangle à 9 nœuds :


$[N]$	$[\partial N/\partial \xi]$	$[\partial N/\partial \eta]$
$\xi\eta(\xi-1)(\eta-1)/4$	$(2\xi-1)\eta(\eta-1)/4$	$\xi(\xi-1)(2\eta-1)/4$
$\xi\eta(\xi+1)(\eta-1)/4$	$(2\xi+1)\eta(\eta-1)/4$	$\xi(\xi+1)(2\eta-1)/4$
$\xi\eta(\xi+1)(\eta+1)/4$	$(2\xi+1)\eta(\eta+1)/4$	$\xi(\xi+1)(2\eta+1)/4$
$\xi\eta(\xi-1)(\eta+1)/4$	$(2\xi-1)\eta(\eta+1)/4$	$\xi(\xi-1)(2\eta+1)/4$
$(1-\xi^2)\eta(\eta-1)/2$	$-\xi\eta(\eta-1)$	$(1-\xi^2)(2\eta-1)/2$
$\xi(\xi+1)(1-\eta^2)/2$	$(2\xi+1)(1-\eta^2)/2$	$-\xi\eta(\xi+1)$
$(1-\xi^2)\eta(\eta+1)/2$	$-\xi\eta(\eta+1)$	$(1-\xi^2)(2\eta+1)/2$
$\xi(\xi-1)(1-\eta^2)/2$	$(2\xi-1)(1-\eta^2)/2$	$-\xi\eta(\xi-1)$
$(1-\xi^2)(1-\eta^2)$	$-2\xi(1-\eta^2)$	$-2\eta(1-\xi^2)$

dérivées secondes du quadrangle à 9 nœuds :

$[\partial^2 N/\partial \xi^2]$	$[\partial^2 N/\partial \xi \partial \eta]$	$[\partial^2 N/\partial \eta^2]$
$\eta(\eta-1)/2$	$(\xi-1/2)(\eta-1/2)$	$\xi(\xi-1)/2$
$\eta(\eta-1)/2$	$(\xi+1/2)(\eta-1/2)$	$\xi(\xi+1)/2$
$\eta(\eta+1)/2$	$(\xi+1/2)(\eta+1/2)$	$\xi(\xi+1)/2$
$\eta(\eta+1)/2$	$(\xi-1/2)(\eta+1/2)$	$\xi(\xi-1)/2$
$-\eta(\eta-1)$	$-\xi(2\eta-1)$	$1-\xi^2$
$1-\eta^2$	$-\eta(2\xi+1)$	$-\xi(\xi+1)$
$-\eta(\eta+1)$	$-\xi(2\eta+1)$	$1-\xi^2$
$1-\eta^2$	$-\eta(2\xi-1)$	$-\xi(\xi-1)$
$-2(1-\eta^2)$	$4\xi\eta$	$-2(1-\xi^2)$

4 Les éléments volumiques

4.1 Tétraèdres : ELREFE TE4, T10



Coordonnées des nœuds :

	x	y	z
$N1$	0.	1.	0.
$N2$	0.	0.	1.
$N3$	0.	0.	0.
$N4$	1.	0.	0.
$N5$	0.	0.5	0.5
$N6$	0.	0.	0.5
$N7$	0.	0.5	0.
$N8$	0.5	0.5	0.
$N9$	0.5	0.	0.5
$N10$	0.5	0.	0.

Fonctions de forme :

Formule à 4 nœuds

$$\begin{cases} w_1(x, y, z) = y \\ w_2(x, y, z) = z \\ w_3(x, y, z) = 1 - x - y - z \\ w_4(x, y, z) = x \end{cases}$$

Formule à 10 nœuds

$$w_1 = y(2y - 1)$$

$$w_2 = z(2z - 1)$$

$$w_3 = (1 - x - y - z)(1 - 2x - 2y - 2z)$$

$$w_4 = x(2x - 1)$$

$$w_5 = 4yz$$

$$w_6 = 4z(1 - x - y - z)$$

$$w_7 = 4y(1 - x - y - z)$$

$$w_8 = 4xy$$

$$w_9 = 4xz$$

$$w_{10} = 4x(1 - x - y - z)$$

Formule d'intégration numérique :

Formule à 1 point, d'ordre 1 en x, y, z : (FPG1)

Point	x	y	z	Poids
1	1/4	1/4	1/4	1/6

Formule à 4 points, d'ordre 2 en x, y, z : (FPG4)

Point	x	y	z	Poids
1	a	a	a	1/24
2	a	a	b	1/24
3	a	b	a	1/24
4	b	a	a	1/24

avec : $a = \frac{5 - \sqrt{5}}{20}$, $b = \frac{5 + 3\sqrt{5}}{20}$

Formule à 5 points, d'ordre 3 en x, y, z : (FPG5)

Point	x	y	z	Poids
1	a	a	a	-2/15
2	b	b	b	3/40
3	b	b	c	3/40
4	b	c	b	3/40
5	c	b	b	3/40

Avec : $a = 0.25$, $b = \frac{1}{6}$, $c = 0.5$

Formule à 15 points, d'ordre 5 en x, y, z : (FPG15)

Point	x	y	z	Poids
1	a	a	a	8/405
2	b_1	b_1	b_1	$\frac{2665-14\sqrt{15}}{226800}$
3	b_1	b_1	c_1	
4	b_1	c_1	b_1	
5	c_1	b_1	b_1	
6	b_2	b_2	b_2	
7	b_2	b_2	c_2	
8	b_2	c_2	b_2	
9	c_2	b_2	b_2	
10	d	d	e	$\frac{5}{567}$
11	d	e	d	
12	e	d	d	
13	d	e	e	
14	e	d	e	
15	e	e	d	

avec :
 $a=0.25$

$$b_1 = \frac{7 + \sqrt{15}}{34}$$

$$b_2 = \frac{7 - \sqrt{15}}{34}$$


$$c_1 = \frac{13 - 3\sqrt{15}}{34}$$

$$c_2 = \frac{13 + 3\sqrt{15}}{34}$$

$$d = \frac{5 - \sqrt{15}}{20}$$

$$e = \frac{5 + \sqrt{15}}{20}$$

4.2 Pentaèdres : ELREFE PE6, P15, P18



Coordonnées des nœuds :

	x	y	z
$N1$	-1.	1.	0.
$N2$	-1.	0.	1.
$N3$	-1.	0.	0.
$N4$	1.	1.	0.
$N5$	1.	0.	1.
$N6$	1.	0.	0.
$N7$	-1.	0.5	0.5.
$N8$	-1.	0.	0.5.
$N9$	-1.	0.5	0.
$N10$	0.	1.	0.
$N11$	0.	0.	1.
$N12$	0.	0.	0.
$N13$	1.	0.5	0.5
$N14$	1.	0.	0.5
$N15$	1.	0.5	0.
$N16$	0.	0.5	0.5
$N17$	0.	0.	0.5
$N18$	0.	0.5	0.

Fonctions de forme :

Formule à 6 nœuds

$$w_1 = \frac{1}{2} y (1-x)$$

$$w_4 = \frac{1}{2} y (x+1)$$

$$w_2 = \frac{1}{2} z (1-x)$$

$$w_5 = \frac{1}{2} z (x+1)$$

$$w_3 = \frac{1}{2} (1-y-z)(1-x)$$

$$w_6 = \frac{1}{2} (1-y-z)(x+1)$$

Formule à 15 nœuds

$$w_1 = y(1-x)(2y-2-x)/2$$

$$w_9 = 2y(1-y-z)(1-x)$$

$$w_2 = z(1-x)(2z-2-x)/2$$

$$w_{10} = y(1-x^2)$$

$$w_3 = (x-1)(1-y-z)(x+2y+2z)/2$$

$$w_{11} = z(1-x^2)$$

$$w_4 = y(1+x)(2y-2+x)/2$$

$$w_{12} = (1-y-z)(1-x^2)$$

$$w_5 = z(1+x)(2z-2+x)/2$$

$$w_{13} = 2yz(1+x)$$

$$w_6 = (-x-1)(1-y-z)(-x+2y+2z)/2$$

$$w_{14} = 2z(1-y-z)(1+x)$$

$$w_7 = 2yz(1-x)$$

$$w_{15} = 2y(1-y-z)(1+x)$$

$$w_8 = 2z(1-y-z)(1-x)$$

Formule à 18 nœuds

$$w_1 = x y (x-1)(2y-1)/2$$

$$w_2 = x z (x-1)(2z-1)/2$$

$$w_3 = x (x-1)(z+y-1)(2z+2y-1)/2$$

$$w_4 = x y (x+1)(2y-1)/2$$

$$w_5 = x z (x+1)(2z-1)/2$$

$$w_6 = x (x+1)(z+y-1)(2z+2y-1)/2$$

$$w_7 = 2 x y z (x-1)$$

$$w_8 = -2 x z (x-1)(z+y-1)$$

$$w_9 = -2 x y (x-1)(z+y-1)$$

$$w_{10} = y (1-x^2)(2y-1)$$

$$w_{11} = z (1-x^2)(2z-1)$$

$$w_{12} = (1-x^2)(z+y-1)(2z+2y-1)$$

$$w_{13} = 2 x y z (x+1)$$

$$w_{14} = -2 x z (x+1)(z+y-1)$$

$$w_{15} = -2 x y (x+1)(z+y-1)$$

$$w_{16} = 4 y z (1-x^2)$$

$$w_{17} = 4 z (x^2-1)(z+y-1)$$

$$w_{18} = 4 y (x^2-1)(z+y-1)$$

Formules d'intégration numérique à 6 points (ordre 3 en x , ordre 2 en y et z) (FPG6)

Point	x	y	z	Poids
1	$-1/\sqrt{3}$	0.5	0.5	1/6
2	$-1/\sqrt{3}$	0.	0.5	1/6
3	$-1/\sqrt{3}$	0.5	0.	1/6
4	$1/\sqrt{3}$	0.5	0.5	1/6
5	$1/\sqrt{3}$	0.	0.5	1/6
6	$1/\sqrt{3}$	0.5	0.	1/6

Formule d'intégration numérique à 8 points : (FPG8)

2 points de Gauss en x (ordre 3).

4 points de Hammer en y et z (ordre 3).

Point	x	y	z	Poids
1	$-a$	1/3	1/3	$-27/96$
2	$-a$	0.6	0.2	25/96
3	$-a$	0.2	0.6	25/96
4	$-a$	0.2	0.2	25/96
5	$+a$	1/3	1/3	$-27/96$
6	$+a$	0.6	0.2	25/96
7	$+a$	0.2	0.6	25/96
8	$+a$	0.2	0.2	25/96

Avec $a=0.577350269189626$

Formule d'intégration numérique à 21 points : (FPG21)

3 points de Gauss en x (ordre 5).

7 points de Hammer en y et z (ordre 5 en y et z).

Point	x	y	z	Poids
1	$-\alpha$	$1/3$	$1/3$	$c_1 \frac{9}{80}$
2	$-\alpha$	a	a	$c_1 \left(\frac{155 + \sqrt{15}}{2400} \right)$
3	$-\alpha$	$1-2a$	a	
4	$-\alpha$	a	$1-2a$	
5	$-\alpha$	b	b	$c_1 \left(\frac{155 - \sqrt{15}}{2400} \right)$
6	$-\alpha$	$1-2b$	b	
7	$-\alpha$	b	$1-2b$	
8	0.	$1/3$	$1/3$	$c_2 \frac{9}{80}$
9	0.	a	a	$c_2 \left(\frac{155 + \sqrt{15}}{2400} \right)$
10	0.	$1-2a$	a	
11	0.	a	$1-2a$	
12	0.	b	b	$c_2 \left(\frac{155 - \sqrt{15}}{2400} \right)$
13	0.	$1-2b$	b	
14	0.	b	$1-2b$	
15	α	$1/3$	$1/3$	$c_1 \frac{9}{80}$
16	α	b	a	$c_1 \left(\frac{155 + \sqrt{15}}{2400} \right)$
17	α	$1-2a$	a	
18	α	a	$1-2a$	
19	α	b	b	$c_1 \left(\frac{155 - \sqrt{15}}{2400} \right)$
20	α	$1-2b$	b	
21	α	b	$1-2b$	

avec :

$$\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}}$$





$$c_1 = \frac{5}{9}$$

$$c_2 = \frac{8}{9}$$

$$a = \frac{6 + \sqrt{15}}{21}$$

$$b = \frac{6 - \sqrt{15}}{21}$$

4.3 Hexaèdres : ELREFE HE8 , H20 , H27



Coordonnées des nœuds :

	x	y	z
N1	-1.	-1.	-1.
N2	1.	-1.	-1.
N3	1.	1.	-1.
N4	-1.	1.	-1.
N5	-1.	-1.	1.
N6	1.	-1.	1.
N7	1.	1.	1.
N8	-1.	1.	1.
N9	0.	-1.	-1.
N10	1.	0.	-1.
N11	0.	1.	-1.
N12	-1.	0.	-1.
N13	-1.	-1.	0.
N14	1.	-1.	0.
N15	1.	1.	0.
N16	-1.	1.	0.
N17	0.	-1.	1.
N18	1.	0.	1.
N19	0.	1.	1.
N20	-1.	0.	1.
N21	0.	0.	-1.
N22	0.	-1.	0.
N23	1.	0.	0.
N24	0.	1.	0.
N25	-1.	0.	0.
N26	0.	0.	1.
N27	0.	0.	0.

Fonctions de forme :

Formule à 8 nœuds

$$w_1 = \frac{1}{8}(1-x)(1-y)(1-z)$$

$$w_5 = \frac{1}{8}(1-x)(1-y)(1+z)$$

$$w_2 = \frac{1}{8}(1+x)(1-y)(1-z)$$

$$w_6 = \frac{1}{8}(1+x)(1-y)(1+z)$$

$$w_3 = \frac{1}{8}(1+x)(1+y)(1-z)$$

$$w_7 = \frac{1}{8}(1+x)(1+y)(1+z)$$

$$w_4 = \frac{1}{8}(1-x)(1+y)(1-z)$$

$$w_8 = \frac{1}{8}(1-x)(1+y)(1+z)$$

Formule à 20 nœuds

$$w_1 = \frac{1}{8}(1-x)(1-y)(1-z)(-2-x-y-z)$$

$$w_2 = \frac{1}{8}(1+x)(1-y)(1-z)(-2+x-y-z)$$

$$w_3 = \frac{1}{8}(1+x)(1+y)(1-z)(-2+x+y-z)$$

$$w_4 = \frac{1}{8}(1-x)(1+y)(1-z)(-2-x+y-z)$$

$$w_5 = \frac{1}{8}(1-x)(1-y)(1+z)(-2-x-y+z)$$

$$w_6 = \frac{1}{8}(1+x)(1-y)(1+z)(-2+x-y+z)$$

$$w_7 = \frac{1}{8}(1+x)(1+y)(1+z)(-2+x+y+z)$$

$$w_8 = \frac{1}{8}(1-x)(1+y)(1+z)(-2-x+y+z)$$

$$w_9 = \frac{1}{4}(1-x^2)(1-y)(1-z)$$

$$w_{10} = \frac{1}{4}(1-y^2)(1+x)(1-z)$$

$$w_{11} = \frac{1}{4}(1-x^2)(1+y)(1-z)$$

$$w_{12} = \frac{1}{4}(1-y^2)(1-x)(1-z)$$

$$w_{13} = \frac{1}{4}(1-z^2)(1-x)(1-y)$$

$$w_{14} = \frac{1}{4}(1-z^2)(1+x)(1-y)$$

$$w_{15} = \frac{1}{4}(1-z^2)(1+x)(1+y)$$

$$w_{16} = \frac{1}{4}(1-z^2)(1-x)(1+y)$$

$$w_{17} = \frac{1}{4}(1-x^2)(1-y)(1+z)$$

$$w_{18} = \frac{1}{4}(1-y^2)(1+x)(1+z)$$

$$w_{19} = \frac{1}{4}(1-x^2)(1+y)(1+z)$$

$$w_{20} = \frac{1}{4}(1-y^2)(1-x)(1+z)$$

Formule à 27 nœuds

$$w_1 = \frac{1}{8} x(x-1) y(y-1) z(z-1)$$

$$w_2 = \frac{1}{8} x(x+1) y(y-1) z(z-1)$$

$$w_3 = \frac{1}{8} x(x+1) y(y+1) z(z-1)$$

$$w_4 = \frac{1}{8} x(x-1) y(y+1) z(z-1)$$

$$w_5 = \frac{1}{8} x(x-1) y(y-1) z(z+1)$$

$$w_6 = \frac{1}{8} x(x+1) y(y-1) z(z+1)$$

$$w_7 = \frac{1}{8} x(x+1) y(y+1) z(z+1)$$

$$w_8 = \frac{1}{8} x(x-1) y(y+1) z(z+1)$$

$$w_9 = \frac{1}{4} (1-x^2) y(y-1) z(z-1)$$

$$w_{10} = \frac{1}{4} x(x+1) (1-y^2) z(z-1)$$

$$w_{11} = \frac{1}{4} (1-x^2) y(y+1) z(z-1)$$

$$w_{12} = \frac{1}{4} x(x-1) (1-y^2) z(z-1)$$

$$w_{13} = \frac{1}{4} x(x-1) y(y-1) (1-z^2)$$

$$w_{14} = \frac{1}{4} x(x+1) y(y-1) (1-z^2)$$

$$w_{15} = \frac{1}{4} x(x+1) y(y+1) (1-z^2)$$

$$w_{16} = \frac{1}{4} x(x-1) y(y+1) (1-z^2)$$

$$w_{17} = \frac{1}{4} (1-x^2) y(y-1) z(z+1)$$

$$w_{18} = \frac{1}{4} x(x+1) (1-y^2) z(z+1)$$

$$w_{19} = \frac{1}{4} (1-x^2) y(y+1) z(z+1)$$

$$w_{20} = \frac{1}{4} x(x-1) (1-y^2) z(z+1)$$

$$w_{21} = \frac{1}{2} (1-x^2) (1-y^2) z(z-1)$$

$$w_{22} = \frac{1}{2} (1-x^2) y(y-1) (1-z^2)$$

$$w_{23} = \frac{1}{2} x(x+1) (1-y^2) (1-z^2)$$

$$w_{24} = \frac{1}{2} (1-x^2) y(y+1) (1-z^2)$$

$$w_{25} = \frac{1}{2} x(x-1) (1-y^2) (1-z^2)$$

$$w_{26} = \frac{1}{2} (1-x^2) (1-y^2) z(z+1)$$

$$w_{27} = (1-x^2) (1-y^2) (1-z^2)$$

Formule de quadrature de Gauss à 2 points dans chaque direction (ordre 3) (FPG8)

Point	x	y	z	Poids
1	$-1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	1.
2	$-1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	1.
3	$-1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	1.
4	$-1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	1.
5	$1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	1.
6	$1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	1.
7	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$-1/\sqrt{3}$	1.
8	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	$1/\sqrt{3}$	1.

Formule de quadrature de Gauss à 3 points dans chaque direction (ordre 5) : (FPG27)

Point	x	y	z	Poids
1	$-\alpha$	$-\alpha$	$-\alpha$	c_1^3
2	$-\alpha$	$-\alpha$	0.	$c_1^2 c_2$
3	$-\alpha$	$-\alpha$	α	c_1^3
4	$-\alpha$	0.	$-\alpha$	$c_1^2 c_2$
5	$-\alpha$	0.	0.	$c_1 c_2^2$
6	$-\alpha$	0.	α	$c_1^2 c_2$
7	$-\alpha$	α	$-\alpha$	c_1^3
8	$-\alpha$	α	0.	$c_1^2 c_2$
9	$-\alpha$	α	α	c_1^3
10	0.	$-\alpha$	$-\alpha$	$c_1^2 c_2$
11	0.	$-\alpha$	0.	$c_1 c_2^2$
12	0.	$-\alpha$	α	$c_1^2 c_2$
13	0.	0.	$-\alpha$	$c_1 c_2^2$
14	0.	0.	0.	c_2^3
15	0.	0.	α	$c_1 c_2^2$
16	0.	α	$-\alpha$	$c_1^2 c_2$
17	0.	α	0.	$c_1 c_2^2$
18	0.	α	α	$c_1^2 c_2$
19	α	$-\alpha$	$-\alpha$	c_1^3
20	α	$-\alpha$	0.	$c_1^2 c_2$
21	α	$-\alpha$	α	c_1^3
22	α	0.	$-\alpha$	$c_1^2 c_2$
23	α	0.	0.	$c_1 c_2^2$
24	α	0.	α	$c_1^2 c_2$
25	α	α	$-\alpha$	c_1^3
26	α	α	0.	$c_1^2 c_2$
27	α	α	α	c_1^3


avec :

$$\alpha = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

$$c_1 = \frac{5}{9}$$

$$c_2 = \frac{8}{9}$$

4.4 Pyramides : ELREFE PY5, P13



La base carrée est constituée par le quadrangle $N_1 N_2 N_3 N_4$ et N_5 est le sommet de la pyramide.

	x	y	z
N_1	1.	0.	0.
N_2	0.	1.	0.
N_3	-1.	0.	0.
N_4	0.	-1.	0.
N_5	0.	0.	1.
N_6	0.5	0.5	0.
N_7	-0.5	0.5	0.
N_8	-0.5	-0.5	0.
N_9	0.5	-0.5	0.
N_{10}	0.5	0.	0.5
N_{11}	0.	0.5	0.5
N_{12}	-0.5	0.	0.5
N_{13}	0.	-0.5	0.5

Fonctions de forme :

Formule à 5 nœuds

$$w_1 = \frac{(-x+y+z-1)(-x-y+z-1)}{4(1-z)}$$

$$w_2 = \frac{(-x-y+z-1)(x-y+z-1)}{4(1-z)}$$

$$w_3 = \frac{(x+y+z-1)(x-y+z-1)}{4(1-z)}$$

$$w_4 = \frac{(x+y+z-1)(-x+y+z-1)}{4(1-z)}$$

$$w_5 = z$$

Formule à 13 nœuds

$$w_1 = \frac{(-x+y+z-1)(-x-y+z-1)(x-0.5)}{2(1-z)}$$

$$w_2 = \frac{(-x-y+z-1)(x-y+z-1)(y-0.5)}{2(1-z)}$$

$$w_3 = \frac{(x-y+z-1)(x+y+z-1)(-x-0.5)}{2(1-z)}$$

$$w_4 = \frac{(x+y+z-1)(-x+y+z-1)(-y-0.5)}{2(1-z)}$$

$$w_5 = 2z(z-0.5)$$

$$w_6 = -\frac{(-x+y+z-1)(-x-y+z-1)(x-y+z-1)}{2(1-z)}$$

$$w_7 = -\frac{(-x-y+z-1)(x-y+z-1)(x+y+z-1)}{2(1-z)}$$

$$w_8 = -\frac{(x-y+z-1)(x+y+z-1)(-x+y+z-1)}{2(1-z)}$$

$$w_9 = -\frac{(x+y+z-1)(-x+y+z-1)(-x-y+z-1)}{2(1-z)}$$

$$w_{10} = \frac{z(-x+y+z-1)(-x-y+z-1)}{1-z}$$

$$w_{11} = \frac{z(-x-y+z-1)(x-y+z-1)}{1-z}$$

$$w_{12} = \frac{z(x-y+z-1)(x+y+z-1)}{1-z}$$

$$w_{13} = \frac{z(x+y+z-1)(-x+y+z-1)}{1-z}$$

Formule d'intégration numérique à 5 points (FPG5) :

Point	x	y	z	Poids
1	0.5	0.	h_1	2/15
2	0.	0.5	h_1	2/15
3	-0.5	0.	h_1	2/15
4	0.	-0.5	h_1	2/15
5	0.	0.	h_2	2/15

avec :

$$h_1 = 0.1531754163448146$$

$$h_2 = 0.6372983346207416$$

Formule d'intégration numérique à 6 points (FPG6) :

Point	x	y	z	Poids
1	a	0.	h_1	p_1
2	0.	a	h_1	p_1
3	-a	0.	h_1	p_1
4	0.	-a	h_1	p_1
5	0.	0.	h_2	p_2
6	0.	0.	h_3	p_3

avec :

$$p_1 = 0.1024890634400000$$

$$p_2 = 0.1100000000000000$$

$$p_3 = 0.1467104129066667$$

$$a = 0.5702963741068025$$

$$h_1 = 0.1666666666666666$$

$$h_2 = 0.08063183038464675$$

$$h_3 = 0.6098484849057127$$

Formule d'intégration numérique à 27 points (FPG27) :

Point	x	y	z	Poids
1	0.	0.	1/2	a_1
2	$b_1(1-z)/2$	$b_1(1-z)/2$	1/2	b_6
3	$-b_1(1-z)/2$	$b_1(1-z)/2$	1/2	b_6
4	$-b_1(1-z)/2$	$-b_1(1-z)/2$	1/2	b_6
5	$b_1(1-z)/2$	$-b_1(1-z)/2$	1/2	b_6
6	0.	0.	$1-b_1/2$	b_6
7	0.	0.	$1+b_1/2$	b_6
8	$c_1(1-z)$	0.	$(1-c_1)/2$	c_8
9	0.	$c_1(1-z)$	$(1-c_1)/2$	c_8
10	$-c_1(1-z)$	0.	$(1-c_1)/2$	c_8
11	0.	$-c_1(1-z)$	$(1-c_1)/2$	c_8
12	$c_1(1-z)$	0.	$(1+c_1)/2$	c_8
13	0.	$c_1(1-z)$	$(1+c_1)/2$	c_8
14	$-c_1(1-z)$	0.	$(1+c_1)/2$	c_8
15	0.	$-c_1(1-z)$	$(1+c_1)/2$	c_8
16	$d_1(1-z)/2$	$d_1(1-z)/2$	$(1-d_1)/2$	d_{12}
17	$-d_1(1-z)/2$	$d_1(1-z)/2$	$(1-d_1)/2$	d_{12}
18	$-d_1(1-z)/2$	$-d_1(1-z)/2$	$(1-d_1)/2$	d_{12}
19	$d_1(1-z)/2$	$-d_1(1-z)/2$	$(1-d_1)/2$	d_{12}
20	$d_1(1-z)$	0.	1/2	d_{12}
21	0.	$d_1(1-z)$	1/2	d_{12}
22	$-d_1(1-z)$	0.	1/2	d_{12}
23	0.	$-d_1(1-z)$	1/2	d_{12}
24	$d_1(1-z)/2$	$d_1(1-z)/2$	$(1+d_1)/2$	d_{12}
25	$-d_1(1-z)/2$	$d_1(1-z)/2$	$(1+d_1)/2$	d_{12}
26	$-d_1(1-z)/2$	$-d_1(1-z)/2$	$(1+d_1)/2$	d_{12}
27	$d_1(1-z)/2$	$-d_1(1-z)/2$	$(1+d_1)/2$	d_{12}

avec :

$$\begin{aligned}
 a_1 &= 0.788073483 \\
 b_6 &= 0.499369002 \\
 b_1 &= 0.848418011 \\
 c_8 &= 0.478508449 \\
 c_1 &= 0.652816472 \\
 d_{12} &= 0.032303742 \\
 d_1 &= 1.106412899
 \end{aligned}$$

5 Bibliographie

- 1 DHATT G., TOUZOT G. : Une présentation de la méthode des éléments finis 2^{ème} édition.
Editeur : MALOINE S.A. Année 984

6 Historique des versions du document

Indice doc	Version Aster	Auteur(s) ou contributeur(s), organisme	Description des modifications
E	8.4	J.Pellet, X.Desroches, EDF/R&D	Version 8 complète.
F	9.2	J.Pellet EDF/R&D/AMA	Correction concernant l'HEXA27, cf. fiche REX 11036
F	9.4	J.Pellet EDF/R&D/AMA	Correction page 21 de la fonction de forme w5 de l'HEXA27 (fiche 12170)
			Correction fonction de forme SE4 (fiche 26110)